

STANDAARDLIJST BASIDIOMYCOTA & MYXOMYCOTA ERRATA & AANVULLINGEN

compilatie: Ruben Walley & Emile Vandeven

m.m.v. H. Beker, P. Debaenst, A. de Haan, S. De Ridder, M-J Duprez, J. Gelderblom,
L. Lenaerts, J. Schoutteten, G. Tilkin, K. Van de Put, P. Van der Veken, L. Vannieuwerburgh,
W. Veraghtert, P. Verstraeten, J. Volders

ERRATA

- p. 27 "Callistosporium luteo-olivaceum f. minor" vervangen door:
Callistosporium **pinicola** Arnolds
syn.: Callistosporium luteo-olivaceum f. minor Bon ex Verbeke & Walley, C. minor
(Verbeke & Walley) Wilhelm
(recent als een aparte soort opgevat, zie Acta Mycol. 41: 29-40 & SZP 2007-4: 134-141,
Nederlandse naam Olijfzwammetje blijft gebonden aan C. luteo-olivaceum s.str.)
- p. 37 Cortinarius **fulvaureus**: in cat. 2 zetten (cfr.-determinatie)
- p. 39 "Cortinarius subarquatus" vervangen door
Cortinarius **luhmannii** Münzmay, Saar & B. Oertel (geen NL naam)
misv.: Cortinarius subarquatus ss. Breitenbach & Kränzlin, C. caesiogriseus ss. Frøslev &
Jeppesen
(zie J.E.C. 6, 2004)
- p. 46 Galerina **vittiformis** f.. vittiformis: Nederlandse naam = "Kaal barnsteenmosklokje!"
- p. 88 Asterostroma **ochroleucum**: schrappen: = A. cervicolor
- p. 91 bij Clavariadelphus ligula NL naam **Kleine knotszwam** toevoegen
- p. 96 Hyphoderma occidentale (i.p.v. -is)
- p.108 (Tomentellina) :
1 m! h! <'80 **fibrosa** (Berk. & M.A. Curtis) M.J. Larsen – Ruig rouwkorstje
syn.: Tomentella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) Köljalg, Tomentellina
ferruginosa Höhn. & Litsch.
- p. 112 aanvullen bij Colacogloae peniophorae: "misv.: Achroomyces effusus (J. Schröt.) Mig. ss. auct."
- p. 113 Andromeda **polifolia** (i.p.v. pro)
- p. 114 **Protodontia subgelatinosa**: schrappen: = Stypella subgelatinosa

AANVULLINGEN

Agaricales

- 2 m! h! **Conocybe** cfr. **gigasperma** Enderle & Hauskn.
Cfr.-determinatie in moeilijke groep (volgens A. de Haan): soort met grote sporen, verwant
aan Conocybe rickenii die volgens Arnolds (FAN 6) slechts een vorm is van zijn breed
opgevatte C. siliginea (met sporen tot 19(22) µm lang). Vermelde collectie is bleek (C.
gigasperma zou donkere soort zijn), en dus ook verwant met C. inocybeoides (met sporen
tot 18-19 µm).
- 1 m! h! **Coprinus saccharomyces** P.D. Orton – Gistgeurinktzwam
- 1 m! h! **Cortinarius biformis** Fr.
- 1 h! **Cortinarius cliduchus** Fr.
- 1 m! h! **Cortinarius lanatus** (Moser) Moser – Bruingele wolgordijnzwam
- 1 m! h! **Cortinarius pluvius** (Fr.: Fr.) Fr.
- 1 h! **Cortinarius porphyropus** (Alb. & Schwein.) Fr. – Purpersteelgordijnzwam
- 1 m! h! **Entoloma depluens** (Batsch: Fr.) Hesler – Bleke schelpsatijnzwam
- 1 m! h! **Entoloma jahnii** Wölfel & Winterh.

- 1 m! h! **Entoloma lepidissimum** (Svrček) Noordel. – Fraaie satijnzwam
Entoloma **parkensis**: wijzigen in cat. 1 en '<80' schrappen
- 1 m! h! **Entoloma phaeocyathus** Noordel. – Grauwe trechtersatijnzwam
- 1 m! h! **Entoloma tibiicystidiatum** Arnolds & Noordel. – Kegelcelsatijnzwam
- 1 m! h! **Entoloma velenovskyi** Noordel. – Klokhoedsatijnzwam
- 1 m! h! **Flammulaster fuisporus** (P.D. Orton) Watling
- 1 m! h! **Hebeloma gigaspermum** Gröger & Zschiesch. – Grootsporige vaalhoed
- 1 m! h! **Hemimycena gracilis** (Quel.) Singer – Smalpoormycena
- 1 m! h! **Hemimycena pseudogracilis** (Kühner & Maire) Singer – Witte gladsteelmycena
- 2 m! h! **Hygrocybe cystidiata** Arnolds
Taxonomische status betwist; volgens sommige auteurs een synoniem van *Hygrocybe citrinovirens*.
- 1 m! h! **Hygrocybe phaeococcinea** (Arnolds) Bon – Karmozijnwasplaat
Hygrophoropsis fuscosquamula P.D. Orton: wijzigen in cat. 1
- 1 m! h! **Inocybe pseudoreducta** Stangl & Glowinski
Marasmius anomalus var. *microsporus*
opm.: ook recent, na 1980 gevonden (De Haan, 11/8/2002, det. J. Lachapelle).
Volgens Noordeloos (FAN3) echter een var. zonder echte taxonomische betekenis.
- 1 m! h! **Leccinum schistophilum** Bon
syn.: *Leccinum palustre* M. Korhonen
- 1 m! h! **Lepiota brunneoilacea** Bon & Boiffard – Zandparasolzwam
- 1 m! h! **Leucoagaricus meleagris** (Sowerby) Singer – Compostchampignonparasol
- 2 h! **Limacella delicata** (Fr.: Fr.) Earle – Tengere kleeftparasol
Taxonomische status betwist; volgens verscheidene auteurs identiek aan van *Limacella glioderma* of varianten van dezelfde soort (*L. delicata* is dan de prioritaire naam).
- 1 m! h! **Lyophyllum maas-geesterani** Cléménçon & Winterh.
- 1 m! h! **Mycena mucor** (Batsch) Quél.– Pantoffelmycena
- 1 m! h! **Mycena pilosella** Maas Geest. – Schapenpootmycena
- 1 m! h! **Omphalina hepatica** (Batsch: Fr.) P.D. Orton
opm.: het lijkt ons beter om deze soort te onderscheiden van *O. pyxidata* (in eerste versie STL opgevat als synoniemen). Volgens Index Fungorum (april 2007) is *Omphalina subhepatica* (Batsch) Murrill de juiste naam.
- 2 m! h! **Panaeolus obliquoporus** Bon
Taxonomische status betwist. Volgens sommige auteurs (in navolging van Gerhardt) een syn. van *P. fimicola*, volgens Finse auteurs (Kytuoivuori et al., RL Finland) een syn. van *P. ater*. Volgens Bon & Courtecuisse (Doc. Mycol. 32, fasc. 127-128) een aparte, donker gekleurde soort (meer verwant met *P. ater*) gekenmerkt door sporen met een excentrische kiempore.
- 1 m! h! **Psathyrella pervelata** Kits van Waveren – Bleke vlokfranjehoed
- 1 m! h! **Pseudoomphalina pachyphylla** (Fr.) Knudsen – Bittere trechterzwam
syn.: *Clitocybe pachyphylla* (Fr.) Gillet
- 2 m! h! **Russula laccata** Huijsman
opm.: cfr.-determinatie; de microscopische kenmerken volgens de opvatting van Sarnari kloppen niet helemaal, deze van Romagnesi (gebaseerd op het typemateriaal) wel. Nieuwe observaties (vooral gayac-reactie) moeten duidelijkheid brengen over dit onvoldoende bevestigd taxon.
- 2 m! h! **Russula langei** Bon
Taxonomische status (soort of vorm) onduidelijk. Verschilt van *R. cyanoxantha* door (zeer) stevige hoed en steel, steel met min of meer violette tinten, reactie met FeSO₄ op steel snel zwak groen, hoedkleuren meestal donker en somber, vooral op leem- en kleibodems.

Aphyllorphorales

- Antrodia lenis* (P. Karst.) Ryvarden
toevoegen van syn.: "Diplomitoporus lenis (P. Karst.) Gilb. & Ryvarden" en wijzigen in cat. 1.
opm.: beter in *Skeletocutis* klasseren?.
- 1 m! h! **Gloeocystidium letendrei** (P. Karst.) Bourdot & Galzin
syn.: *Gloeocystidiellum luridum* var. *microsporum* Z.C. Chen & Sang H. Lin
opm.: hoort tot *Gloeocystidiellum* maar deze combinatie bestaat nog niet.
- 1 m! h! **Hyphodontia microspora** J. Erikss. & Hjortstam – Nietigsporige tandjeszwam
Wingene, Gulke Putten, D2.13.20, 21/10/2006, herb. J. Schoutteten 06/59
- 1 m! h! **Junghuhnia lacera** (P. Karst.) Niemelä & Kinnunen – Raspachtige poria
syn.: *Junghuhnia separabilima* (Pouzar) Ryvarden, *Steccherinum separabilimum* (Pouzar) Vesterh. (ongeldig)
- 1 m! h! **Litschauerella clematidis** (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden
Membranomyces spurius: wijzigen in cat. 1
- 1 m! h! **Minimedusa pubescens** Diederich, Lawrey & Heylen
Recent beschreven soort uit de groep van anamorfe lichenicole basidiomyceten.
Typelokaliteit: Prov. Antwerpen, Heist-op-den-Berg, Booischoot, Hof Ter Laken, op *Scoliciosporum chlorococcum* op *Frangula alnus* (zie *Mycol. Progress* 6: 71, 2007)
- 1 m! h! **Phlebia subulata** J. Erikss. & Hjortstam
- 1 h! **Podoscypha multizonata** (Berk. & Broome) Pat.
- 1 m! h! **Sistotrema dennisii** Malençon – Poroïde urnkorstzwam
- 1 m! h! **Sistotrema binucleospora** Hallenb. – Tweekernige urnkorstzwam
Sistotremastrum suecicum J. Erikss.: wijzigen in cat. 1
- 1 m! h! **Trechispora sphaerocystis** Burds. & Gilb.
- 1 m! h! **Typhula culmigena** (Mont. & Fr.) Berthier

Heterobasidiomyceten

aanvullen bij *Colacogloae peniophorae*: "misv.: *Achroomyces effusus* (J. Schröt.) Mig. ss. auct."

- 1 m! h! **Eocronartium muscicola** (Pers.) Fitzp.
- 1 m! h! **Exidiopsis griseobrunnea** K. Wells & Raitv.
- 1 m! h! **Filobasidiella lutea** P. Roberts

aanvullen bij *Marchandiobasidium aurantiacum*: "anamorf: *Marchandiomyces aurantiacus* (Lasch) Diederich & Etayo"

- 2 m! h! **Polyporus septosporus** P.K. Buchanan & Ryvarden
opm.: cfr.-determinatie; een op *Polyporus tuberaster* gelijkende soort (of afwijkende vorm?), beschreven uit Nieuw-Zeeland, met gesepteerde sporen
- 1 m! h! **Stypella legonii** P. Roberts
syn.: *Protodontia ellipsospora* D.A. Reid (ongeldig)
- 1 m! h! **Tremella moriformis** Berk.

Gasteromyceten

- 1 h! **Mutinus elegans** (Mont.) E. Fisch. – Spitse stinkzwam

Urediniomyceten

1 m! h! **Puccinia glomerata** Grev.
syn.: Puccinia senecionis Lib.

Myxomyceten

Physarum **lateritium** (Berk. & Ravenel) Morgan: wijzigen in cat. 1 en '<80' schrappen

Bijgewerkte versie tabel 3.

Tabel 3. Totaal aantal soorten (cat. 1), aantal soorten uit huizen en serres, aantal soorten niet meer waargenomen sinds 1980, en aantal variëteiten en vormen, per taxonomische groep.

Table 3 Total number of species recorded (# spp., cat. 1), number species restricted to houses and greenhouses (cat. 4), number of species not recorded since 1980, and number of additional varieties and forms.

		Tot. # spp.	cat. 4	<'80	# var./f.
Basidiomycota	Agaricales s.l.	1701	10	61	137
	Aphylophorales s.l.	575	2	22	3
	Heterobasidiomyceten	140	0	1	1
	Gasteromyceten	77	1	5	1
	Urediniomyceten	115	0	5	10
	Ustilaginomyceten	28	0	10	0
Myxomycota		198	3	10	15
<i>Totaal</i>		2834	16	114	167